

Framboisier (Framboise) *Rubus idaeus, Rubus strigosus*

Famille : Rosacées

Origine : Europe

Période de floraison : de mai à octobre selon le type

Couleur des fleurs : blanc

Exposition : mi-ombre

Type de sol : riche en humus, léger

Acidité du sol : neutre à acide, calcaire accepté

Humidité du sol : normal

Utilisation : jardin fruitier

Hauteur : 2 m

Type de plante : arbuste fruitier

Type de végétation : vivace

Type de feuillage : caduc

Rusticité : rustique

Plantation, rempotage : automne

Méthode de multiplication : bouturage en automne, séparation des drageons, éclatement des touffes

Taille : La taille des remontants se pratique de novembre à février. Coupez les pousses de l'année en dessous de la partie qui a fructifié en septembre. Sélectionnez de 6 à 8 drageons de remplacement, qui seront taillés comme pour les framboisiers non remontants. Supprimez les autres drageons ainsi que les pousses qui ont fructifié deux fois.

Espèces, variétés intéressantes :

Les variétés les plus communes sont : 'Heritage', 'September', 'Zeva'.

Maladies et insectes nuisibles : le botrytis, le ver des framboises, les pucerons

Toxicité : ras

Cet arbuste appartient à la famille des Rosacées. Le nom d'espèce *idaeus* fait référence au fait que les Anciens croyaient que le mont Ida en Crète était le lieu d'origine de cet arbuste. Mais il semble bien que le framboisier soit indigène dans de nombreux pays européens, dont la France, puisque l'on trouve des framboisiers sauvages dans les Alpes, le Jura et le massif Central. Le framboisier est également fréquent en forêt.

Le nom framboise vient de la déformation de " fraise des bois ".

Les variétés cultivées de framboisier et des autres ronces ont des fleurs autofertiles. Les fleurs du framboisier et autres *Rubus* sont très attractives pour les abeilles. La floraison se prolonge pendant 2 à 3 semaines en mai-juin.

La plantation des framboisiers se pratique en hiver, pendant le repos végétatif. Les tiges vivent 2 ans. Vertes la 1^{re} année, elles fleurissent et se lignifient la 2^e année. Elles sont alors appelées cannes. Les cannes mortes sont coupées chaque année après la fructification. Les plantations doivent être régulièrement désherbées, tant à cause du préjudice direct engendré par les mauvaises herbes (notamment le liseron et le chiendent qui paralysent la végétation des framboisiers), que par la possibilité de propagation de maladies par les graines de mauvaises herbes. Les framboisiers sont généralement cultivés le long d'une armature de 3 fils de fer horizontaux, tendus à 40 cm de distance.

La récolte débute la 2^e année. Un framboisier peut produire durant 10 à 15 ans.

Les framboisiers remontants.

Chez ces framboisiers qui sont les plus appréciés des amateurs, en raison de leur production échelonnée, les jeunes drageons de l'année produisent déjà une première fois, en septembre. Ils portent à nouveau des fruits en juillet de l'année suivante, avant de se dessécher et de mourir.

Ils poussent partout

Un terrain fertile et frais est idéal, mais le framboisier pousse partout, même dans les terres calcaires. Espacez chaque framboisier de 1 m en tous sens. Lors de la plantation, toutes les branches des framboisiers sont rabattues entre 20 et 30 cm au-dessus du sol. Enterrez bien chaque plant de 10 cm de profondeur. La seconde année, on conserve toutes les pousses, hormis celles qui ont éventuellement fructifié. Durant la végétation, ne pas oublier d'éliminer les rejets les plus faibles ou les moins bien placés. C'est à partir de la troisième année de plantation que la récolte devient intéressante.

Petit conseil : plantez des myosotis entre les framboisiers pour éviter l'attaque du ver des framboises.

Le saviez-vous ?

La légende veut que la framboise fut jadis blanche. La nymphe Ida, fille du roi de Crète et nourrice de Zeus voulut un jour cueillir ces fruits pour nourrir son protégé. Mais elle s'égratigna le sein aux épines de l'arbuste. Et aussitôt, les fruits prirent la couleur de son sang.



Les framboises

Il existe plusieurs types de framboises



- les framboises que l'on retrouve à l'état sauvage
- les framboisiers cultivés non remontants
- les framboisiers cultivés remontants
- les Framboisiers aux couleurs différentes, noirs, pourpres, bleus ou jaunes

Les framboisiers sauvages

Le *rubus chamaemorus* est d'origine surarctique, il porte des fleurs blanches et des fruits jaunes.

Le *rubus odoratus* a des belles fleurs rosées odorantes qui ressemblent aux églantines. Le fruit rouge vif est insipide. Il est utilisé comme framboisier d'ornement.

Le *rubus idaeus* est le framboisier sauvage qui porte des fruits rouges, juteux et parfumés. Il est à l'origine de la plupart des variétés cultivées.

Le *rubus deliciosus* des Montagnes Rocheuses est à l'origine des variétés à fruits pourpres.



Rubus idaeus

Le *rubus occidentalis* d'origine nord-américaine, est le parent des espèces à fruits noirs




Rubus chamaemorus

Les framboisiers non remontants

Fragaria vesca

Ce sont des les variétés habituelles de framboisiers qui ne donnent qu'une seule récolte par année.

Les plants émet au printemps des nouveaux rejets (primocanes) qui se développeront en été et fructifront l'année suivante en juillet (floricanes), puis se dessèchent et meurent. Les talles portent donc en même temps des tiges nouvelles de l'année qui ne fait que du feuillage et des tiges fructificatrices de l'année précédente.



Multiplication : les framboisiers se multiplient par rejets de la talle. (suckers)



Taille des framboisiers



Éclaircissez les tiges restantes à 4 au pied

À la fin de l'été ou tôt le printemps, enlevez toutes les tiges qui ont fructifiés. linéaire.

La culture des framboisiers

Le choix du site Les framboisiers aiment le plein soleil, un sol riche en matière organique, bien drainé, au pH 5.5 à 6.6. Le site doit être bien aéré pour diminuer les maladies. Détruire tous les framboisiers sauvages et les ronces dans un rayon de 150 mètres. Ne pas planter à la suite d'une culture de fraisiers, pommes de terre, tomates, piments et aubergines pour éviter les maladies. Une culture d'engrais vert précédent la plantation est recommandé.

Plantation : La plantation peut se faire à l'automne ou tôt le printemps. Planter à 40-50 cm entre les plants et 2 à 3 mètre entre les rangs.

Fertilisation : Appliquer un engrais pour fleurs et légumes à la plantation et un engrais fort en azote en bandes le long des rangs.

Irrigation : de la floraison à la fin des récoltes, maintenir le sol humide spécialement durant la période de grossissement et mûrissement des fruits.

Protection hivernale attacher les framboisiers par paquets de 5 ou 6 afin d'éviter le bris des tiges par les fortes accumulations de neige.

L'engazonnement entre les rang est une pratique culturale.