

Noisetier (Noisette)
Corylus avellana

Famille : Bétulacées

Origine : Europe, Asie mineure, Algérie

Période de floraison : hiver

Couleur des fleurs : brun

Exposition : soleil, mi-ombre

Type de sol : ordinaire

Acidité du sol : acide, neutre, accepte le calcaire

Humidité du sol : normal

Utilisation : isolé

Hauteur : 5 m

Type de plante : arbre fruitier

Type de végétation : vivace

Type de feuillage : caduc

Rusticité : -20°C

Plantation, rempotage : automne

Méthode de multiplication : bouturage en novembre, prélèvement de drageons, marcottage, semis mais les noisettes obtenues sont plus petites qu'une obtention par bouturage ou marcottage

Taille : Un éclaircissage peut être pratiqué régulièrement pour aérer le pied. En fin d'automne, coupez les branches gênantes.

Espèces, variétés intéressantes :

- *Corylus avellana contorta*, le noisetier tortueux aux branches entrelacées.
- *Corylus avellana* 'Nottingham' donne de grosses noisettes
- *Corylus maxima* 'Atropurpurea' le noisetier franc au feuillage pourpre décoratif et aux excellentes noisettes - 2 m

Maladies et insectes nuisibles : les larves du balanin ou ver des noisettes

Toxicité : ras

Le noisetier est monoïque, ce qui signifie qu'il a des fleurs mâles et femelles sur le même pied. Le vent se chargera de polliniser les fleurs. Pour une bonne pollinisation, il est nécessaire de planter au moins deux variétés.